



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# CAB NEWSLETTER

## สารที่ปรึกษาบุญชัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 96 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2557


สารเพื่อสร้างความเข้าใจ ป้องกัน/ดูแลชุมชน ให้ห่างไกลจากเอดส์และยาเสพติด

### การรักษาเอชไอวีให้หายขาด คือหน้าไปแค่ไหนแล้ว?

การค้นหาวิธีรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีให้หายขาด เป็นหัวข้อหลักที่ถูกพูดถึงกันมากในปัจจุบัน การประชุมแพทย์และนักวิจัยเกี่ยวกับเรโทรไวรัสและโรคติดเชื้อรายโอกาส (CROI - Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกที่จัดขึ้นที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 3-6 มีนาคม ที่ผ่านมา นักวิจัยงานความก้าวหน้าของเรื่องนี้ให้ทราบกันค่ะ

#### 1. มีทางกที่หายจากเอชไอวีอีกหรือไม่

ในการประชุม ครอยปีที่แล้ว Deborah Persaud จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อพกินส์ รายงานกรณีเด็กทารกจากมิสซิสซิปปีที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่กระหงหว่างตั้งครรภ์ ในสถานการณ์ที่เลี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สูงอย่างยิ่งนี้ แพทย์ได้ตัดสินใจให้ยาต้านไวรัสสูตรที่ใช้สำหรับการรักษาแก่ทารกน้อยเมื่อเด็กคลอดออกมาก้าวเดียวประมาณ 30 ชั่วโมง เด็กขาดการรักษาไปภายหลังจากอายุได้ 18 เดือน แต่เมื่อกลับเข้าสู่การรักษาอีกครั้ง 医疗保健 แพทย์พบว่าปริมาณไวรัสในเลือดของทูน้อยต่ำกว่าระดับที่รู้ดีทั้งๆ ที่เรอยังไม่ได้กินยาต้านไวรัสใด ๆ เลย



มีต่อหน้า 2

- 1 การรักษาเอชไอวีให้หายขาด คือหน้าไปแค่ไหนแล้ว?
- 3 วิสัยทัศน์ของงานชุมชน
- 5 เฉลย แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางชีวการแพทย์ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีกัน
- 7 พัฒนา
- 8 ส่ายตา...หาร่อง (มาเล่า)
- 9 โครงการวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ (وارี 306)  
ความสุขสุดยอด (อย่าคิดลึก...)
- 10 การศึกษาเจลที่ผสมยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
- 12 บอกเล่า...เก็บสิบ



ในที่ประชุมปีนี้ ดร. Persaud ได้เล่าความคืบหน้าของเด็กน้อยผู้โชคดีรายนี้ให้ฟังว่า ปัจจุบันเด็กอายุได้ 3 ปี และหยุดยาต้านไวรัสมาได้ 2 ปีแล้ว ยังคงตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือด (undetectable blood viral load) ไม่พบเชื้อในเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) หรือในแหล่งหลบซ่อนของเชื้อ (reservoirs) อีก ฯ สรุปได้ว่าเด็กยังคงปลอดจากการติดเชื้อเอชไอวีแสดงให้เห็นว่าการรักษาเด็กทารกอย่างรวดเร็วสามารถนำไปสู่การหายจากโรคแบบ “functional cure” ได้ (functional cure หมายถึง การที่ผู้ป่วยสามารถหยุดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีได้โดยไม่มีผลเสียใดๆ ต่อสุขภาพตามมาจากการติดเชื้อเอชไอวีที่ยังคงเหลืออยู่ในร่างกาย)