



Q : ผู้ที่เสพกัญชาในปริมาณมาก จะทำให้ร่างกาย...



A : เสื่อมโทรมทำงานไม่ได้



Q : กัญชามีฤทธิ์กดประสาท ทำให้ผู้เสพมีอาการ...



A : เชื่องซึมคล้ายคนเมาสุรา



Q : หญิงตั้งครรภ์ หากเสพกัญชา จะทำให้บุตรที่เกิดมามีอาการ...



A : płกร



Q : กัญชา มีโอกาสทำให้ผู้เสพมีความจำ...



A : ความจำเสื่อม



Q : เสพกัญชา อาจเสี่ยงทำให้เกิดโรคอะไรในกลุ่มวัยรุ่นได้ เพราะวัยรุ่นมีสารเซโรโทนิน (ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ต่างๆ) มากกว่าผู้อื่น



A : โรคซึมเศร้า



Q : กัญชาทำลายสมรรถภาพทางเพศ ทำให้...



A : ฮอโมนและอสุจิลดลง



Q : หากร่างกายได้รับสารที เอช ซี ในกัญชา มากเกินไป มีผลต่อ....



A : สมอง



Q : เสพกัญชาร่างกายจะได้รับสาร...

THC
ที เอช ซี

A : ที เอช ซี



Q : สุกกัญชาระหว่างตั้งครรภ์ ทารกจะ...



A : คลอดก่อนกำหนด



Q : ใบกัญชามี.....แฉก



7-11 แฉก
A : 7-11 แฉก



Q : ห้ามขายกัญชาแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ากี่ปี...



A : อายุต่ำกว่า 20 ปี



Q : พืชเสพติดชนิดใด มีความเสี่ยงที่จะทำลายสมอง ปอดและทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย



A : กัญชา



Q : ผู้เสพกัญชา มีโอกาสทำให้ดวงตา เปลี่ยนเป็นสีอะไร



A : ตาแดง เพราะเส้นเลือดฝอยในดวงตาขยายตัว



Q : สารสกัด ที เอช ซี จากกัญชา ทั่วมากกว่าจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ

THC
>0.2 %

A : มากกว่า 0.2%



Q : กัญชา มีฤทธิ์อย่างไรต่อระบบประสาท



A : ออกฤทธิ์ผสมผสาน



Q : เสพกัญชาแล้วขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้นเท่า ...



x 2
A : 2 เท่า



Q : การกลืนเป็นเนื้องอกในสมอง เกิดจาก...



A : แม่เสพกัญชาระยะที่ท้อง



Q : เสพกัญชาระยะแรกสารที เอช ซี ในกัญชาทำให้ผู้เสพ...



A : ตื่นตัวมากกว่าปกติ



Q : สูดกัญชาตั้งแต่เด็ก เป็น วัยรุ่น ทำให้ ไอคิว ...

IQ



A : ไอคิว ลดลง



Q : อาการของคนเสวกัญชาในระยะแรก...



A : หัวเราะง่าย



Q : อันตรายจากการสูบกัญชา สรรสารก่อนจะเริ่มเพราะ...



A : กัญชาเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์



Q : เสวกัญชา + ดื่มเหล้า แล้วขับรถ มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด...



A : อุบัติเหตุเพิ่มขึ้น



Q : เด็ก-เยาวชน ควรหลีกเลี่ยง ขนม อาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชาอาจจะส่งผลให้...



A : มีอาการพิษเฉียบพลันได้



Q : อยู่ในห้องหรือบ้านเดียวกัน กับคนเสวกัญชา ทำให้...



A : เป็นผู้เสวกัญชามือ 2



Q : สารสกัด ที เอช ซี จากกัญชา เริ่มออกฤทธิ์ กดประสาทผู้เสวกัญชาหลังจากที่เสวกายใน ...



1-2 ชั่วโมง

A : 1-2 ชั่วโมง



Q : คนที่ได้รับจากที่ผู้อื่นสูบกัญชา ส่งผลต่อ.....ผู้ไม่เสวก



A : ระบบหายใจของผู้ที่ไม่เสวก



Q : คนที่สูบกัญชาเป็นประจำเสี่ยงที่จะเป็น โรครจิตที่เท่า เมื่อเทียบกับคนไม่สูบกัญชา

เกือบ **5 เท่า**

A : เกือบ 5 เท่า



Q : ทำไมผู้หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร
ควรหลีกเลี่ยงการกิน-สูบบุหรี่



A : มารับกัญชาผ่านน้ำนมแม่



Q : การสูบกัญชามีสารตัวเดียวกับบุหรี่คือ...



สารก่อมะเร็ง

A : สารก่อมะเร็ง



Q : กัญชามีผลต่อสมองวัยรุ่นรุนแรง
และเป็นพิษมากกว่า...



A : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เหล้า เบียร์)



Q : เด็ก-เยาวชน กินขนม คุณก็ บราวน์
ที่มีกัญชาผสมมากจะเกิดอะไรขึ้น...



A : ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ



Q : แม่ที่สูบกัญชามวนบุหรี่ในขณะตั้งครรภ์
ทารกในครรภ์มีโอกาสปากแหว่งเพดานโหว่
มากกว่าทารกที่แม่ไม่สูบกัญชาขณะตั้งครรภ์กี่เท่า

2 เท่า



A : 2 เท่า