

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็ก-วัยรุ่นเสพ

กัญชา

// เสพกัญชาระยะแรกทำให้ผู้เสพ
ตื่นตัวจากการได้รับสาร ที เอช ซี (THC)
หลังจากเสพ 1-2 ชั่วโมง กัญชาจะออกฤทธิ์กดประสาท
มีโอกาสสมองเสื่อม เป็นโรคจิตเภท //

**เด็ก วัยรุ่น
อายุต่ำกว่า 20 ปี
ห้ามใช้-เสพกัญชา**

ตั้งครรภ์-การก

- แม่ตั้งท้องแล้วเสพกัญชา
แม่อาจจะซึมเศร้า ประสาทหลอน
ความจำเสื่อม หอบหืด
- การคลอดก่อนกำหนด
- การรกเกิดมาน้ำหนักน้อยกว่าปกติ
- การรกพัฒนาการทางสมองต่ำ
- ชะลอการเจริญเติบโตของการก
- การกเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมอง
- การกเสี่ยงเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว



รู้ไว้เพื่อห่างไกลกัญชา



เสพกัญชาแล้วขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุเพิ่ม 2 เท่า
และมากขึ้นถ้าเสพกัญชาพร้อมกับดื่มเหล้า-เบียร์



อยู่ร่วมกับคนเสพกัญชา เป็นผู้เสพมือสอง
ร่างกายได้รับผลกระทบเหมือนเป็นคนเสพกัญชาเอง

วัยเด็ก

เด็กในวัยเรียน เสพกัญชาจะทำให้

- มึนหัว ปวดหัว
- สมาธิสั้น สมองช้า ความจำไม่ดี
- ก้าวร้าว
- เพลียง่ายง่วงบ่อย
- ซึมเศร้า
- ประสาทหลอน หูแว่ว



วัยรุ่น

เสพกัญชา เพราะอาจทำให้

- สมองสั่งงานช้า
- ซึมเศร้า เลื่อนลอย
- ไม่มีเหตุผล
- ควบคุมตัวเองไม่ได้
- เห็นภาพหลอน ประสาทหลอน
- หวาดระแวง หูแว่ว
- เป็นโรคจิตเภท



เด็ก-เยาวชน ระวังนะ! อย่าทานขนม อาหาร เครื่องดื่มที่ผสมกัญชา
อาจจะส่งผลให้ร่างกายมีอาการพิษเฉียบพลันได้

ระบบหัวใจ

- หน้ามืด วูบหมดสติ
- ใจสั่น แน่นหน้าอก
- ชีพจรเต้นผิดจังหวะ
- เหนื่อย หายใจไม่สะดวก
- ความดันโลหิตสูง



ระบบทางเดินอาหาร

- ปวดท้อง
- คลื่นไส้
- อาเจียน



ระบบประสาท

- เวียนศีรษะ
- แขนขาอ่อนแรง
- พุดไม่ชัด
- สับสน เดินเซ ชัก
- กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก
- อารมณ์แปรปรวน

